

---

# Venøs tromboembolisme – insidens og risikofaktorer i Oslo

---

KORRESPONDANSER

FINN G. STREKERUD

ANNE METTE JOHANSEN

ULRICH ABILDGAARD

---

## *En rettelse*

Vår artikkel i Tidsskriftet nr. 25/1998 omhandlet alle tilfeller av venøs tromboembolisme behandlet ved Aker sykehus i perioden 1993 – 95 (1). På grunnlag av diagnoseregistre fant vi 378 tilfeller, derav to pasienter som døde av lungeemboli mens de var under akutt behandling, samt ett tilfelle der pasienten døde av behandlingsrelatert blødning. På denne bakgrunn oppgav vi en letalitet relatert til behandlet venøs tromboembolisme på 0,8 %.

Vi har nå gått i gjennom alle obduksjoner fra samme tidsrom (1 256 obduksjoner, obduksjonsfrekvens 56 %). Det kom frem at ytterligere sju pasienter døde av lungeemboli under behandling for venøs tromboembolisme (2). I ett tilfelle hadde avdelingen kun ført diagnosen cancer ovarii i journalen. I seks tilfeller var diagnosen lungeemboli tilføyet i journalen, men ved feil var dette ikke blitt rettet i diagnoseregisteret. Når disse funn inkluderes, blir letaliteten av behandlet venøs tromboembolisme i akuttfasen  $10/385 = 2,6$  %.

---

## LITTERATUR

1. Strekerud F, Johansen AM, Abildgaard U. Venøs tromboembolisme – insidens og risikofaktorer i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 3934 – 8.
2. Johansen AM, Tveit ECB, Strekerud FG, Abildgaard U. Surviving and fatal cases of venous thromboembolism (VTE) in a defined population of Oslo, Norway. Abstrakt. Thromb Haemost 1999; (suppl): A799.

---

Publisert: 20. april 2000. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 7. juli 2026.