
Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne

ARTIKKEL

RYDER TE

HAUKELAND EA

SOLHAUG JH

Sammendrag

Bilateral infrapatellar seneruptur er en relativt sjelden skade. Vi omtaler en 32 år gammel kvinne som ved løpstreningsnublet og pådrog seg en bilateral infrapatellar seneruptur. Vi mener at dette må være en uvanlig skademekanisme, oganser det også som uvanlig at det dreier seg om en bilateral skade hos en ung frisk kvinne. Diagnosen ble bekreftet vedeksplorativt inngrep åtte dager etter innleggelsen. Til tross for gjentatte kliniske, røntgenologiske ogultrasonografiske undersøkelser ble diagnosen stilt relativt sent, da vi i utgangspunktet ikke fant traumet adekvat tilå gi en slik omfattende skade. Diagnosen av patellaseneruptur bør baseres på anamnese og grundig klinisk undersøkelse. Røntgenundersøkelse og ultrasonografi er diagnostiske hjelpemidler.

Publisert: 10. januar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. september 2026.