
Frie vaskulariserte transplantater ved rekonstruksjoner i hode- og halsregionen

ARTIKKEL

BOYSEN M

NATVIG K

STØRE G

TRAAHOLT L

SANDSMARK MÅ

LØTVEIT T

BREKKE IB

BAKKA A

REIGSTAD A

HETLAND K

Sammendrag

Fra 1989 har vi gjennomført 40 rekonstruksjoner med frie vaskulariserte transplantater på 39 pasienter. 32 pasienter hadde ondartede svulster og sju defekt eller osteoradionekrose i underkjeven. Underarmstransplantat ble anvendt hos 17 pasienter (fem med del av radius), lateralt overarmstransplantat hos sju, fibula hos fem og et segment av tynntarm ble anvendt for rekonstruksjon av hypopharynx hos 11. 36 av transplantatene, hvorav tre etter revisjon, innheltefullstendig. Tre underarmslapper og

beinet i en underarmslapp nekrotiserte. Disse ressurskrevende operasjoner børforbeholdes pasienter med god allmenntilstand. De funksjonelle og kosmetiske resultater synes å være bedre ved frietransplantater enn ved stilkete lapper.

Publisert: 20. januar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 12. september 2026.