
Postoperativ bakteriuri og urinveisinfeksjon hos gynekologiske pasienter

ARTIKKEL

SCHIØTZ HA

Sammendrag

Postoperativ bakteriuri forekommer hyppig og er oftest relatert til bruk av kateter. Risiko for at asymptomatiskbakteriuri skal utvikle seg til symptomatisk infeksjon er ikke klarlagt. I alt 454 kvinner som ikke fikk antibiotika, ble fulgt opp prospektivt med henblikk på asymptomatisk bakteriuri og urinveisinfeksjon etter gynekologiske inngrephvor foleykateter ble brukt i gjennomsnittlig 1,4 dager. Kvinner med asymptomatisk bakteriuri ble ikke rutinemessigbehandlet, men ble fulgt i inntil en måned før eventuell behandling.

I alt hadde 243 (53,5%) kvinner postoperativ bakteriuri, og 74 (16,3%) fikk urinveisinfeksjon. Positivedyrkingsprøver hadde lav prediktiv verdi for utvikling av infeksjon, også hos pasienter med pyuri.

Blant 174 kvinner utskrevet med bakteriuri, fikk 36 (20,7%) infeksjon, alle unntatt to med gramnegative bakteriereller enterokokker. Blant 240 pasienter med negative dyrkingsprøver før hjemreise, fikk kun tre (1,3%) infeksjon. Forsinket spontan vannlatning etter kateterfjerning medførte signifikant økt risiko for å utvikle infeksjon. Artikkelen gir forslag om håndtering av pasienter med postoperativ bakteriuri.

Publisert: 20. januar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 13. september 2026.