
Granulocyttkolonistimulerende faktor ved nøytropeni sekundært til lymfoid beinmargsinfiltrasjon

ARTIKKEL

HAMMERSTRØM J

Sammendrag

Alvorlig nøytropeni sekundært til massiv lymfoid beinmargsinfiltrasjon ved lavgradig malign lymfoproliferativ sykdommedfører økt infeksjonsfare, spesielt etter beinmargshemmende cytostatikabehandling. Tre pasienter (to med kronisklymfatisk leukemi og en med follikulært lymfom) med massiv beinmargsinfiltrasjon og nøytropeni som ikke skyldtescytostatikabehandling, ble behandlet med granulocyttkolonistimulerende faktor (G-CSF) for å se om nøytropenien kunnereverseres. Alle tre pasienter fikk konsentrasjonsstigning av nøytrofile granulocytter i perifert blod til normaleeller høyere verdier under behandlingen. G-CSF gitt etter en påfølgende cytostatikabehandling hindret antakeligalvorlig cytostatikainduisert nøytropeni hos en pasient. Ny behandling av en av pasientene med G-CSF i en senere,preterminal fase av sykdommen gav liten effekt på nøytrofile granulocyttdverdier. G-CSF ser ut til å kunne øke periferenøytrofile granulocyttdverdier selv hos pasienter med alvorlig nøytropeni som skyldes lymfoid beinmargsinfiltrasjon.

Publisert: 10. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 14. juli 2026.