
Endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer

ARTIKKEL

HATLINGHUS S

DALE LG

NORDBY A

AADAHL P

LUNDBOM J

SÆTHER OD

MYHRE HO

Sammendrag

De siste års utvikling innen endovaskulær teknologi har gjort det mulig å benytte intraluminal karprotese hos enkeltpasienter med abdominalt aortaaneurisme. Protesen føres opp fra femoralarteriene og plasseres i aorta underrøntgengjennomlysning.

Åtte pasienter, seks menn og to kvinner ble behandlet for infrarenalt abdominalt aortaaneurisme med endovaskulærteknikk i perioden februar-august 1995.

Gjennomsnittsalderen var 67,3 år. Vi benyttet bifurkaturprotese av typen MialheStentor, MinTec. Implantasjonene ble foretatt i epiduralanestesi. Inngrepet utføres ved arteriotomi i a. femoraliscommunis på den ene siden, mens man benytter perkutan teknikk på motsatt side.

Alle implantasjonene var teknisk og klinisk vellykkede. Alle pasienter med ett unntak fikk lett kost samme kveld somoperasjonen ble foretatt og var dagen etter oppegående, og uten kostrestriksjoner. Metoden representerer en mindrebelastning for pasientene enn konvensjonell operasjon, og det er grunn til å tro at behandlingsformen kan

værekostnadsbesparende. Den preoperative vurdering med tanke på valg av riktig størrelse på implantatet og en nitid teknikki forbindelse med selve implantasjonen, er avgjørende for et godt resultat.

Publisert: 28. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.