
Colonperforasjon under kombinert steroid- og strålebehandling

ARTIKKEL

WIIG JN

AASS N

KARLSEN KO

GIERCKSKY K-E

Diagnostikk og behandling

Sammendrag

Vi har retrospektivt vurdert åtte pasienter med colonperforasjon etter steroid- og strålebehandling. Sigmoideumdivertikler perforerte etter minimum fem dagers steroidbehandling. Varierende grad av magesmerter var det viktigste symptom. Kliniske parametere var usikre. Røntgen oversikt abdomen med påvisning av fri luft var den viktigste enkeltundersøkelsen, men heller ikke positiv hos alle. Sju pasienter ble operert, én med sutur, resten med Hartmanns operasjon. Ingen utviklet postoperativ peritonitt. Én døde av hjerneinfarkt. Fire døde etter utskrivning, innen 38 døgn. Uklare abdominalsymptomer under høydose steroidbehandling bør gi mistanke om colonperforasjon. Raskoperativ intervensjon med reseksjon eller sutur muliggjør ukomplisert postoperativt forløp.

Publisert: 28. februar 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 8. september 2026.