
Lungefunksjon blant norske husdyrbønder

ARTIKKEL

VARSLØT M

HILT B

QVENILD T

LANGSETH H

Sammendrag

Lungefunksjonen hos et utvalg husdyrbønder ble undersøkt og sammenliknet med et norsk referansemateriale. Med unntak av PEF viste alle de målte variablene lavere verdier enn forventet. Forskjellene var statistisk signifikante for alle variabler bortsett fra for FVK. Grisebønder hadde høyere verdier enn andre bønder for FVK, FEV1 og PEF, mens fjærbønder hadde lavere verdier enn andre bønder for PEF. En tredel av bøndene hadde mer enn 20% nedsettelse av FEV25-75%. Det kan tyde på at de mindre, perifere luftveiene hyppigere blir affisert enn de store, sentrale luftveier. Ved denne undersøkelsen er det ikke funnet noen enkeltårsak til lungefunksjonsforandringene, men bønder som hadde nyedriftsbygninger, hadde lavere lungefunksjon enn andre, spesielt for storfebønder om bygningene var oppført i årene 1975-84.

Publisert: 30. mars 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 27. juli 2026.