

---

# Behandling av ukomplisert gonoré hos voksne

---

ARTIKKEL

AAVITSLAND P

HØIBY EA

---

Nye anbefalinger fra Arbeidsgruppen mot gonoré

---

## Sammendrag

Effektiv behandling er viktig for å opprettholde den lave insidensen av gonoré i Norge. Mer enn hvert fjerde tilfelleer nå forårsaket av en gonokokkstamme som er resistent mot standardbehandlingen med amoxicillin eller pivampicillin. Vianbefaler derfor engangsdose med ciprofloxacin 500 mg eller ofloxacin 400 mg peroralt som nye førstevalg ved behandling av gonoré. Ved resistens mot fluorokinoloner og til gravide og ammende kvinner anbefales engangsdose med cefotaxim 500mg eller spectinomycin 2 g intramuskulært.

Kontrollprøve skal tas for å oppdage resistente stammer eller reinfeksjoner og for å kunne friskmelde pasienten. Iherdig smitteoppsporing, om nødvendig i samarbeid med kommunelegen, er svært viktig ved gonoré.

Mikrobiologisk bekreftelse av diagnosen, resistensbestemmelse av bakterieisolatene og kontroll etter behandling er viktig for den løpende revurdering av disse anbefalingene.

---

Publisert: 20. mai 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.