
Økt påvisning av prostatakreft

ARTIKKEL

OTNES B

HARVEI S

FOSSÅ SD

Betydningen av prostataspesifikt antigen

Sammendrag

Ved Bærum sykehus økte antallet nye tilfeller av prostatakreft fra 65 i 1991 til 102 i 1994. Ved gjennomgåelse av kliniske data finner vi tendens til diagnose i noe tidligere sykdomsstadium. Det skyldes sannsynligvis i stor grad øktbestemmelse av prostataspesifikt antigen (PSA). Denne praksis førte også til at flere asymptomatiske menn fikk stilt diagnosen (hhv. 16 og 24% i de to periodene). PSA-bestemmelse hos disse førte kun til radikalbehandling hos én pasient, mens den hos ti forårsaket at de fikk diagnostisert sykdom som det ikke ble ansett indisert å behandle. Dette skyldtes ikke minst at PSA-bestemmelse ble brukt som ledd i rutinemessig helsekontroll av eldre menn. Vi fraråder dette hos asymptomatiske menn over 70 år. Ressursene bør heller settes inn hos yngre. Vi minner om at øvre normalgrense for prostataspesifikt antigen nå vanligvis settes til 4 mg/l.

Publisert: 10. juni 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.