
Laparoskopisk brokkreparasjon

ARTIKKEL

GAUPERAA T

RØNNING G

VONEN B

KJÆVE J

Sammendrag

I tiden september 1992 til mai 1993 ble det utført 14 laparoskopiske brokkreparasjoner på 13 pasienter. Det var toindirekte og 12 direkte brokk. Fem av brokkene var residivbrokk, hvorav to annengangs residiv. Det ble hos samtlige iintubasjonsnarkose utført en transabdominal preperitoneal brokkreparasjon med implantasjon av et polypropylennett. Pasientene hadde lite postoperativ smerte og var lette å mobilisere. Det var ingen peroperative komplikasjoner. Iobservasjonstiden (17-24 måneder) døde én pasient av hjertelidelse og to pasienter utviklet residivbrokk, henholdsvis fire og ti måneder postoperativt. En pasient fikk et nytt brokk på den andre siden. Operasjonsmetoden er tekniskvanskeligere og mer tid- og ressurskrevende enn åpen tensjonsfri brokkreparasjon. Bortsett fra ved enkelte avdelinger der man har spesialinteresse og kompetanse i laparoskopiske teknikker, vil laparoskopisk brokkreparasjon neppe blirutinemetode ved primæroperasjon for lyskebrokk. Metoden kan være et godt alternativ ved residivbrokk og bilateralebrokk.

Publisert: 30. september 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.