
Intraarteriell trombolyse ved perifere bypass- og arterieokklusjoner

ARTIKKEL

SANDBÆK G

STAXRUD LE

ROSÉN L

BAY D

STIRIS M

GJØLBERG T

Sammendrag

Hensikten med undersøkelsen var å undersøke sammenhengen mellom vellykket intraarteriell trombolysebehandling avokkluderte arterier/karproteser til underekstremitetene og noen viktige kliniske og angiografiske faktorer.

Pasientenskjønn og alder, symptomer, symptomvarighet, okklusjonslengde, type kar, distalt avløp og kateterspissens plassering ble vurdert. 46 pasienter ble behandlet med kontinuerlig intraarteriell infusjon av streptokinase. 12 pasienter fikk karveggsaktivator (tPA).

I streptokinasegruppen ble lyse oppnådd hos 27 av 46 pasienter (59%). Vi fant en signifikant assosiasjon mellom vellykket trombolyse og godt distalt avløp ($p < 0,01$). Lyse ble oppnådd hos bare én av 11 pasienter hvorkateteret ikke ble ført ned i okklusjonen. Et primært vellykket resultat ble oppnådd hos ni av 12 pasienter (75%) behandlet med karveggsaktivator.

I denne undersøkelsen var tilfredsstillende distalt avløp og intratrombotisk kateterposisjon nærmest avgjørende for et godt resultat.

Publisert: 20. oktober 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

