
Forsinkede symptomer på hypoksisk hjerneskade etter forbigående bedring

ARTIKKEL

TVEDT B

KROGSTAD JM

BERSTAD J

ROALSØ S

Sammendrag

En verftsarbeider sveiset i et rør, med argon som dekkgass. Da han etter en pause skulle kontrollere sveisen, besvimtehan inne i røret. Han ble reddet ut etter 15-20 minutter, og kom til bevissthet etter noen timer. Etter to dager blehan utskrevet fra sykehuset som frisk. Etter en uke ble han gjeninnlagt, med forvirring, sviktende hukommelse, afasi,apraksi og urininkontinens. Cerebral MT viste økt signalintensitet bilateralt i nucleus caudatus. Han ble gradvisbedre, og begynte etter seks måneder i halv jobb, med lettere arbeid. Sykdomsforløpet passer med forsinket hjerneskadeetter hypoksi; argon må antas å ha fortrenget oksygen. Forsinkede symptomer skyldes demyelinisering i subkortikal hvitsubstans. Det er beskrevet etter hypoksi forårsaket av blant annet CO, anestesi, HCN, H₂S, heroin, metadon,kvelnings- og hengingsforsøk.

Publisert: 20. oktober 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 15. juli 2026.