
Behandling av skuddskader i ansiktet

ARTIKKEL

HØGEVOLD HE

LYBERG T

Sammendrag

Pasienter med skuddskader i ansiktet skal gjennomgå en generell undersøkelse og resuscitering i skadestue, der frieluftveier sikres og blødninger stanses. Videre utredning med røntgen thorax, CT caput med ansiktsskjelett og eventueltrøntgen cervicalcolumna og angiografi er nødvendig. Den tidlige kirurgiske behandling er avhengig av type skuddskade, dvs. hvorvidt det dreier seg om høyenergiskuddskade, lavenergiskuddskade eller nærskudd med hagle. Tradisjonellbehandling av skuddskader i ansiktet er basert på erfaringer med høyenergiskader i krig og består av debridement, primær sutur og lukket frakturbehandling. Denne behandlingen gir dårlig stabilisering av gjenværende bein med kollaps og kontraksjon av bløtvevene. I senere år har man også ved skuddskader initialt benyttet moderne maksillofacialrekonstruksjonsprinsipper slik som åpen reduksjon og plateosteosyntese, beintransplantasjoner, bløtvevsrekonstruksjoner og anvendelse av frie vaskulariserte transplantater. Denne initiale endelige behandlingen gir bedre estetiske og funksjonelle resultater og anbefales spesielt ved lavenergiskader, men er også aktuell ved høyenergiskader og nærskudd med hagle.

Publisert: 20. januar 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.