
Cytomegalovirusinfeksjon hos nyfødte

ARTIKKEL

FJÆR RB

ABRAHAMSEN TG

BRUU A-L

HANSEN TWR

Sammendrag

Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette ved fødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller hjerneaffeksjon. Av de resterende ni vil kanskje én senere utvikle sekvele i form av nedsatt hørsel og/eller mental retardasjon. Infeksjon med cytomegalovirus kan også akkvireres i nyfødtp perioden, og vil da kunne forårsake pneumoni og/eller et sepsisliknende sykdomsbilde, muligens også gastrointestinale symptomer som tarmlørdning og dårlig vektøkning. Vi har diagnostisert CMV-infeksjon hos tinyfødte/spedbarn, og beskriver disse med tanke på symptomer, diagnostikk og behandling. Behandling med ganciklovir er under klinisk utprøvdng hos nyfødte med CMV-infeksjon, og ble gitt til to av våre pasienter med tilsynelatende godt resultat.

Publisert: 20. april 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.