
Subaraknoidalblødning i Vestfold

ARTIKKEL

KLOSTER R

Sammendrag

I en prospektiv undersøkelse er alle pasienter fra Vestfold fylke som har vært innlagt i sykehus for spontansubaraknoidalblødning i tiden mai 1991–desember 1995 undersøkt og fulgt i minst tre måneder etter blødningen. Totalt ble det innlagt 76 pasienter i perioden. Dette gir en insidens på 8,1/100000/år. Gjennomsnittsalderen ved blødning var 52,7 år. 36 pasienter (48%) fikk påvist et intrakranielt aneurisme som årsak til blødningen. De fleste aneurismene var lokalisert til a. communicans anterior og a. cerebri media. Sju pasienter blødde på grunn av en arteriovenøsmalformasjon. I alt 23 pasienter (30%) døde av blødningen, hvorav 15 døde av primærblødningen og åtte av reblødning 8–25 døgn etter den primære blødningen. Mortaliteten for pasienter over 60 år var 48%, mens den var 19% for pasienter under 60 år. Pasientens kliniske tilstand ved innleggelsen bedømt ved Hunt & Hess' skala var den viktigste faktor for overlevelse og prognose, bedømt ut fra Glasgow Outcome Scale.

Publisert: 20. mai 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.