
Thyreoidেকirurgi i Aust-Agder

ARTIKKEL

BAARDBSEN AJ

JOHANSEN S

Sammendrag

I 15-årsperioden 1978-92 ble en uselektert serie av 344 konsekutive pasienter operert i skjoldkjertelen. Retrospektivanalyse viste en årlig median operasjonsinsidens på ca. 25 per 100000 innbyggere; 2,5 for cancer, 2,3 for Basedowssykdom og 20,5 for benigne knuter. Observasjonstiden var 3-18 år etter operasjonen. Det var ingen operasjonsmortalitet, men komplikasjoner ble registrert hos 6%: permanent hypoparatyreoidisme hos fire pasienter, permanent unilateralrekurrensskade hos seks. Ingen hadde bilateral rekurrensskade.

Finnålsaspirasjonscytologi bør anvendes rutinemessig for evaluering av knutestroma.

Resultatene i denne serien er på linje med profesjonell standard når det gjelder den store pasientgruppen med benigne knuter. For de små gruppene med cancer og Basedowssykdom kan bedre resultater oppnås ved sentralisering. Det haster med å fastslå hvilken grenspesialitet som skal ha ansvaret for thyreoidেকirurgien i Norge.

Publisert: 10. juni 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. juli 2026.