
Statiner - bivirkningsmønster med vekt på psykiske reaksjoner

ARTIKKEL

BUAJORDET I

MADSEN S

OLSEN H

Sammendrag

Bivirkninger ved statinbruk rapportert nasjonalt og internasjonalt presenteres. Salg av kolesterolsenkende midler istatingruppen har økt med en faktor på 30 i perioden 1989-96. Publiserte kliniske undersøkelser konkluderer med atstatinene er effektive og sikre, med sjeldne og lite alvorlige bivirkninger. De vanligste reaksjonene er forhøyedeleverenzymnivåer og myopati. Data fra det norske spontanrapporteringssystemet og fra WHO's internasjonale database i perioden 1988-95 inneholder rapporter om bivirkningsreaksjoner knyttet til flere andre organsystemer som f.eks. nervesystemet, mage-tarm-kanalen, huden og kardiovaskulære organer. I det norske materialet er 15% av rapporterte bivirkninger psykiske reaksjoner. Reaksjonene er i hovedsak aggressivitet, nervøsitet, depresjon, angst, søvnforstyrrelser og impotens. Mekanisme(n) bak disse bivirkningene er ikke kjent, men reduksjon i serumkolesterolnivå diskuteres som mulig årsak.

Publisert: 20. september 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 15. juli 2026.