
Kolorektalcancer

ARTIKKEL

SYNNESTVEDT M

MEEN Ø

HOFSTAD B

Sammendrag

Det er hevdet at cancersymptomene fra de ulike områder av colon er forskjellige. Hensikten med studien var å finne uthvor godt de "klassiske" symptomene skilte mellom adenokarsinomer i henholdsvis høyre og venstre colon og rectum. Dette var en retrospektiv studie av 102 pasienter med kolorektalcancer ved Ullevål sykehus 1992. Rødt blod i avføringen ($p = 0,001$) og endret avføringsmønster ($p = 0,001$) var venstresidig cancer-spesifikke og rectumspesifikke symptomer. Videre var tenesmer, slim i avføring og defekasjonssmerter rectumspesifikt. Melena ($n = 8$), diaré ($p = 0,23$), slapphet ($p = 0,13$), vekttap ($p = 0,09$), subileus/ileus ble ikke funnet lokalisasjonsspesifikt, noe som ofte hevdes i lærebøkene. Smerte samsvarte alltid med lokalisasjon ved høyre- og venstresidig cancer, men ved rectumcancer mer variabelt lokalisert og forekom her også relativt ofte (37%) i Dukes' stadium A og B. Kun få pasienter hadde anoreksi, men dette var likevel signifikant for høyresidig cancer ($p = 0,04$). Våre resultater støtter generelt lærebøkene, med noen unntak, og henvisningssymptomer kan være en hjelp til videre utredning av kolorektalcancer, når man har problemer med å oppnå total koloskopi.

Publisert: 30. oktober 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. september 2026.