
Systemisk reumatoid artritt

ARTIKKEL

LILLEBY V

GRAN JT

Sammendrag

Ekstraartikulære manifestasjoner som vaskulitt og serositt er relativt sjeldne, men alvorlige komplikasjoner ved reumatoid artritt. Systemaffeksjoner opptrer oftest noen år etter sykdomsdebut, men kan også utvikles før ellersamtidig. De hyppigste organmanifestasjoner ved systemisk reumatoid artritt er kutan vaskulitt, polyneuropati og perikarditt. Tilstanden er assosiert med høye titre av IgG-reumatoide faktorer, og menn angripes hyppigere enn kvinner. Erosive artrittforandringer er vanlige, men systemaffeksjonene utvikles ofte i faser med inaktiv synovitt. Tilstanden behandles med cyklofosamidpulser.

Vi presenterer to pasienter med reumatoid artritt som utviklet ekstraartikulære manifestasjoner som perikarditt, polyneuropati, kutan vaskulitt, fibroserende alveolitt, reumatoide noder i lungene, episkleritt og mesangioproliferativ glomerulonefritt med halvmandannning.

Publisert: 30. november 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. juli 2026.