
Denguefeber importert til Norge

ARTIKKEL

JENSENIUS M

GUNDERSEN SG

VERNE S

BRUU A-L

Sammendrag

Denguefeber, og dens alvorlige variant hemoragisk denguefeber, er i løpet av de siste tiårene blitt et betydelig globalt helseproblem. Sykdommen er nå endemisk i folkerike områder i bl.a. Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Øst-Afrika. Denguefeber rammer hovedsakelig lokalbefolkningen, men også personer på besøk fra ikke-endemiske områder.

Vi presenterer her samtlige 26 tilfeller med serologisk verifisert denguefeber diagnostisert i Norge i perioden 1991-96. 21 (84%) pasienter var smittet i Asia. Typisk hudutslett, leukopeni og trombocytopeni ble registrert henholdsvis 71, 79 og 84%. En 37 år gammel indiskfødt kvinne utviklet hemoragisk denguefeber stadium 1, mens øvrige 25 pasienter gjennomgikk klassisk denguefeber. Postinfeksiøse komplikasjoner var vanlige, og fire uker etter det akutte forløpet ble håravfall, mental depresjon og asteni registrert hos henholdsvis 45, 50 og 100% av tilfellene.

Publisert: 30. november 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. juli 2026.