
Barn med Aspergers syndrom

ARTIKKEL

BJØRKLUND G

Sammendrag

I 1944 beskrev Hans Asperger (1906-80), en østerriksk lege, en gruppe barn med svekket sosial interaksjon og kommunikasjon. Navnet på denne sykdommen er i dag Aspergers syndrom, og den er ført opp som en undergruppe undergjennomgripende utviklingsforstyrrelser i DSM-IV og ICD-10. Denne artikkelen omhandler følgende aspekter ved Aspergerssyndrom: personlighetstrekk, epidemiologi, etiologi, utredning, differensialdiagnoser, behandling og prognose. Artikkelen er basert på en litteraturstudie. Aspergers syndrom ansees å forekomme betydelig hyppigere enn "klassisk" autisme. Syndromet forekommer mye hyppigere hos gutter enn hos jenter. Det kliniske bildet vi ser ved Aspergers syndromer sannsynligvis påvirket av mange faktorer, medregnet organiske og genetiske faktorer. Aspergers syndrom hører tildelen av det autistiske spekter med høyest funksjonsnivå. Det er mange likheter mellom Aspergers syndrom og autisme når det gjelder svekket evne til gjensidig interaksjon, kommunikasjon og omfanget av interesser og aktiviteter. Forskjeller finnes først og fremst i graden av svekkelse i språk og kognitiv utvikling. Differensialdiagnoser, utredning og behandling er diskutert. Det er behov for videre forskning. Det er viktig at de diagnostiske kriteriene for Aspergerssyndrom er så enhetlige som mulig, og ikke overlapper med infantil autisme.

Publisert: 20. april 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. juli 2026.