
Reflekser hos hjernedød pasient

ARTIKKEL

ULVIK A

SALVESEN R

NIELSEN EW

Sammendrag

En pasient innlagt med svær akutt intracerebral blødning ble erklært hjernedød etter typiske symptomer på cerebraltamponade ved neurologisk undersøkelse og apnétest. Senere samme dag ble diagnosen revidert pga. tilkomnereflekser.

Respiratorbehandling ble avsluttet etter seks døgn fordi man ikke så mulighet for bedring av pasientens sværehjerneskode. Samtidig fant man det uetisk å fortsette behandling med tanke på mulighet for organdonasjon på et seneretidspunkt.

Litteraturgjennomgang viser imidlertid at hjernedøde personer over tid kan ha varierende autonome og spinalreflekser i en grad som har overrasket mange leger og forsinket diagnostiseringen. Dermed taper man muligheten for organdonasjon.

Vi mener at vår pasient var hjernedød allerede innleggelsesdagen, og at cerebral angiografi, som ikke ble utført idette tilfellet, burde vært gjort. Av hensyn til pårørende, de involverte leger og organmottakerne er det viktig at diagnosen hjernedød stilles på korrekt tidspunkt. Det må ikke være rom for tvil når diagnosen først er satt.

Publisert: 20. mai 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. september 2026.