

Bilaterale lungefortetninger hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling

ARTIKKEL

HALVORSEN S

JACOBSEN D

GIÆVER P

VON DER LIPPE E

Sammendrag

Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinskovervåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i løpet av 21 måneder. Kun de som trengteventilasjonsstøtte (respirator eller kontinuerlig overtrykksbehandling (CPAP)) for respirasjonssvikt av ikke-kardiogenårsak ble inkludert. Alle pasientene hadde definisjonsmessig akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Tre av pasientene haddeWegeners granulomatose, tre hadde Pneumocystis carinii-pneumoni på bakgrunn av langvarig immunsuppressiv behandling ogtre hadde bakteriell pneumoni som komplikasjon til kronisk sykdom. To pasienter hadde aspirasjonspneumoni.Stafylokokksepsis, systemisk lupus erythematosus, sarkoidose, cancerassosiert hemolytisk uremisk syndrom og akuttlungesviktsyndrom på ukjent basis ble funnet hos én pasient hver. Sju pasienter døde under oppholdet. Ut ifra våreerfaringer diskuteres utredning og behandling av denne typen pasienter.

Publisert: 10. oktober 1998. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 19. august 2026.