
Tuberkulose i Bergen i 1996

ARTIKKEL

NORDTVEDT S

GULSVIK A

HEXEBERG A

HOFSTAD T

CAUGANT DA

Sammendrag

I 1996 meldte Haukeland Sykehus 30 pasienter med tuberkulose til det sentrale tuberkuloseregister. Ved dyrking fikk 63% påvist *Mycobacterium tuberculosis*. 13 av pasientene, åtte voksne og fem barn, alle norskfødte, kom fra en venne- og familiekrets (utbruddet). Samtlige voksne var infisert med samme bakteriestamme.

Vi har sammenliknet kliniske funn, bakteriologi og behandling hos de voksne pasientene i utbruddet med de øvrige voksne pasientene som samme år fikk påvist lungetuberkulose ved Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus. Pasientene i utbruddet var unge voksne uten tidligere lungerøntgenforandringer. De øvrige norskfødte med lungetuberkulose var eldre, og to hadde lungerøntgenforandringer som ved tidligere gjennomgått tuberkulose. Det var ingen forskjell i kjønnsfordeling, BCG-status, tuberkulinresultat, symptomer, fysiske funn eller røntgenbilde av thorax mellom de to gruppene. Syrefaste staver ble påvist i direkte mikroskopi hos fire i utbruddet og hos fire av de andre.

Tuberkulose har ingen spesifikke symptomer eller lungesykdom, og tidlig diagnose kan være vanskelig å stille. For å hindre dødsfall og eliminere sykdommen må allmennpraktikere og sykehusleger ha en høy klinisk beredskap for tuberkulose ved regelmessig faglig oppdatering.

Publisert: 10. januar 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 8. september 2026.