
Ryggglidelser i Norge - en epidemiologisk beskrivelse

ARTIKKEL

BRAGE S

LÆRUM E

Sammendrag

Ryggglidelser forekommer hyppig og genererer store utgifter for helsetjenesten, trygden og arbeidsgiverne.

Artikkelen beskriver prevalensen av ryggsmarter og arbeidshindrende ryggglidelse i den norske befolkning samt insidensen og varigheten av arbeidshindrende ryggglidelse i Aust-Agder fylke. Det fremlegges data fra helseundersøkelsen 1995 og fra Rikstrygdeverkets registre over trygdeytelser.

45% av voksne kvinner og 38% av voksne menn rapporterte ryggsmarter i løpet av en 14-dagersperiode. Prevalensen av arbeidshindrende ryggglidelse var 1,9%. Ryggglidelser var årsak til 13-17% av prevalensen av sykefravær, attføring/rehabiliteringspenger og uførepensjon i 1995.

I Aust-Agder var insidensen av sykefravær på grunn av ryggglidelse høyere blant menn. For 16% av dem som ble sykmeldt for ryggglidelser uten utstråling, varte sykefraværet lenger enn sju uker. Tilsvarende tall for ryggglidelse med utstråling var 35%.

Antall personer med ryggglidelse med utstrålende smerter synes å øke mest. Videre forskning, forebyggende tiltak og retningslinjer for det kliniske arbeidet bør sette søkelyset på gruppen av personer som utvikler kronisk arbeidshindrende ryggglidelse.

Publisert: 30. april 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 12. september 2026.