

Medullakompresjon ved metastatisk kreftsykdom

ARTIKKEL

BRENNE E

KAASA S

FALKMER U

SKAANES KO

HUSBY OS

MYHR G

NILSEN G

BOVIM ER

TELHAUG R

Sammendrag

Kreftpasienter med medullakompresjon på grunn av metastatisk kreftsykdom står i fare for å utvikle irreversible nevrologiske utfall med det funksjonstap dette innebærer. Det kliniske bildet starter ofte med ryggsmertor med påfølgende utvikling av nevrologiske utfall. Det er alltid risiko for rask forverring. Mistanke om medullakompresjon anses som grunn til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Pasientene bør utredes med magnetisk resonanstomografi (MR) hvis mulig. Behandling med glukokortikoider bør startes umiddelbart. Strålebehandling eller kirurgisk behandling er aktuelt for de fleste pasientene og bør startes så raskt som mulig. Hvor god funksjon pasienten oppnår etter behandlingen er avhengig av grad av nevrologiske utfall ved start av behandlingen.

Publisert: 20. september 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.