
Behandling av neonatal hyperbilirubinemi med BiliBed

ARTIKKEL

LINDGREN C

NILSSON T

Sammendrag

En åpen kryssundersøkelse av 22 nyfødte, friske barn ble gjennomført for å kartlegge effektivitet og eventuellefordeler med ett nytt behandlingsredskap for fototerapi, BiliBed. Eliminasjon av bilirubin, forandringer av kroppstemperatur, væskebalanse, hjerte- og pustefrekvens samt observert motorisk uro under behandling med BiliBed ble undersøkt og sammenliknet med målte verdier for dem som ble behandlet med konvensjonell fototerapi. Beggebehandlingsformer var likeverdige med hensyn til reduksjon av serum-bilirubin. Hjerterefrekvens og pustefrekvens varsignifikant lavere ved behandling med BiliBed. Foreldrene til barna som ble behandlet med BiliBed, var svært fornøyde. Ingen ulemper ble notert. BiliBed kan bli et viktig redskap ved eventuell hjemmebehandling av ukompliserthyperbilirubinemi hos nyfødte.

Publisert: 10. november 1999. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 9. september 2026.