
Covid-19-vaksinasjon blant helsepersonell i Tyskland og Norge

LEGELIVET

JUDITH ROSTA

judith.rosta@lefo.no

Judith Rosta er seniorforsker ved LEFO – Legeforskningsinstituttet.

Sykehuspersonell slutter i høy grad opp om covid-19-vaksinasjon. Men hvilke argumenter har sykehusansatte for og mot slik vaksinering?



Robert Koch-instituttet i Berlin. Foto: imageBROKER/NTB

Robert Koch-instituttet i Tyskland gjennomførte i perioden juni–juli 2021 en nasjonal, elektronisk tverrsnittsstudie om graden av, og holdninger til, covid-19-vaksinasjon (1). Studien omfattet 16 975 ansatte i ulike yrkesgrupper fra 111 sykehus. Et bredt utvalg av sykehus og mange respondenter ga et godt grunnlag for generalisering.

Flest fullvaksinerte (to doser) var det blant renholdere (97 %), fulgt av leger og kjøkkenansatte (94 %), medarbeidere i laboratorier, administrasjon og tekniske avdelinger (91 %), mens den laveste andelen var blant sykepleiere (90 %). Andelen uvaksinerte varierte fra 2 % blant leger til 6 % blant sykepleiere.

«Flest fullvaksinerte (to doser) var det blant renholdere (97 %), fulgt av leger og kjøkkenansatte»

Grunnene til at man valgte ikke å vaksinere seg, var først og fremst frykt for varig skade (56 %), at man var utrygg på ny vaksinasjonsteknologi (54 %) og frykt for alvorlige bivirkninger (47 %) (1). Svarene samsvarer godt med andre undersøkelser i

den tyske befolkningen (2). De viktigste grunnene til å la seg vaksinere var ønsket om å beskytte eget nærmiljø (94 %) og seg selv (93 %), å følge arbeidsgivers oppfordring (93 %), å beskytte kolleger (76 %) og pasienter (61 %), å ikke belaste kolleger med eget fravær (29 %) samt ønsket om å komme tilbake til en normal hverdag (8 %) (1).

Tall fra Folkehelseinstituttet viser høy vaksinasjonsgrad blant yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten også i Norge: leger (98 %), sykepleiere (96 %) og renholdere (92 %) (3). Ifølge Folkehelseinstituttet er det mange årsaker til forskjellene i vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen: tilgjengelighet, holdning, opprinnelsesland, alder og tillit (4). Disse kan trolig også forklare noen av forskjellene mellom land og yrkeskategorier.

Befolkningen i Norge har høy tillit til vaksinasjon mot covid-19 (5). Helsepersonell har en nøkkelfunksjon i vaksinasjonsprogrammet. Høy vaksinasjonsdekning, godt tilpasset informasjonsarbeid og bruk av helsepersonell som rollemodeller kan virke fremmende for vaksinasjonsgraden i befolkningen (3, 5). En høy vaksinasjonsgrad blant sykehusansatte og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten er viktige for å ivareta ansatte best mulig, for å beskytte pasientene og for å sikre kontinuitet i pasientbehandlingen. Regelmessig datainnhenting om vaksinasjonsgrad og holdning til covid-19-vaksinasjon kan gi grunnlag for målrettet intervensjon.

REFERENCES

1. Robert Koch Institut. Die Krankenhausbasierte Online-Befragung zur COVID-19-Impfung. 2021.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/Kroco-Report041021.pdf?__blob=publicationFile Lest 15.1.2022.
2. FORSA. Befragung von nicht geimpften Personen zu den Gründen für die fehlende Inanspruchnahme der Corona-Schutzimpfung. 2021.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Befragung_Nichtgeimpfte_-_Forsa-Umfrage_Okt_21.pdf Lest 15.1.2022.
3. Folkehelseinstituttet. Covid-19 ukerapport – uke 6.
<https://www.fhi.no/nyheter/2022/ukerapport-covid-19-uke-6-er-publisert/> Lest 15.1.2022.
4. Rolfheim-Bye CL, Furuseth E, Daae AO et al. Tillit og vaksinasjon i Norge.
<https://www.fhi.no/nettpub/folkehelse/rapporten-temautgave-2021/del-1-9/tillit-og-vaksinasjon-i-norge/> Lest 20.1.2022.
5. Folkehelseinstituttet. Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud.
<https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/verktoykasse/#helsepersonell-har-flere-viktige-roller-i-vaksinasjonsprogrammet> Lest 20.1.2022.