
En potensielt farlig malformasjon i indre øre

MEDISINEN I BILDER

AUDUN ODLAND


audun.odland@sus.no

Avdeling for radiologi

Stavanger universitetssjukehus

Audun Odland er spesialist i radiologi og har europeisk diplom i pediatrik nevroradiologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.



Det øverste bildet er et utsnitt fra en standard CT caput med volumopptak, her vist med benalgoritme og benvindu i nivå med indre øre. Indikasjonen var et kritisk sykt barn med redusert bevissthet. Mellomøre (m), cochlea (c), vestibulum (v) og indre øregang (i) er markert bilateralt. Indre øre på venstre side er normalt. I indre øre på høyre side er det en medfødt malformasjon. Cochlea har normal størrelse, men fremstår cystisk og mangler intern arkitektur. Det er en bred åpning (gul pil) mellom basis av cochlea og indre øregang. Vestibulum er forstørret, men kan differensieres fra cochlea.

Malformasjonen er forenlig med *incomplete partition type 1*, tidligere kalt cystisk kokleovestibulær malformasjon [\(1\)](#). Ved denne malformasjonen har de fleste et uttalt nevrogen hørselstap ipsilateralt. Hos noen vil det også foreligge lekkasje av cerebrospinalvæske fra indre øregang til mellomøret via en fistel gjennom indre øre. På bildet ses innhold i høyre mellomøre lateralt for det ovale vindu (rød pil). Dette er et uspesifikt funn, men det kan være for eksempel cerebrospinalvæske og/eller infeksjon.

De to nederste bildene er fra en MR-undersøkelse tatt ti dager etter CT. Pasienten ble i mellomtiden behandlet for pneumokokkmeningitt. Det er utsnitt av to sekvenser, 3D-T2-DRIVE og fettsupprimert 3D-T2-FLAIR, i nivå med nedre del av mellomøret. Bare høyre side er vist. Det er innhold i mellomøret (m) som har svært høyt signal på DRIVE og suppressert signal på FLAIR. Dette er samme signalmønster som man ser i cerebrospinalvæsken i subaraknoidalrommet (s) omkring hjernestammen og lillehjernen. Dette er en indikasjon på at det foreligger cerebrospinalvæske i mellomøret og er et indirekte tegn på at det kan foreligge en cerebrospinalvæskefistel [\(2\)](#). Denne kan verifiseres ved positiv test på beta-2-transferrin, forutsatt at det kan

samles nok væske til analyse (2). En cerebrospinalvæskefistel til mellomøret medfører risiko for residiverende bakteriell meningitt og kan behandles med kirurgisk lukking (1).

Pasienten og pasientens foreldre har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

Artikkelen er fagfellevurdert.

REFERENCES

1. Sennaroğlu L, Bajin MD. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations. Balkan Med J 2017; 34: 397–411. [PubMed][CrossRef]
 2. Breen JT, Edwards CR, Cornelius RS et al. Utility of magnetic resonance imaging in differentiating cerebrospinal fluid leak from middle ear effusion. Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161: 493–8. [PubMed][CrossRef]
-

Publisert: 24. oktober 2022. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.22.0220

Mottatt 13.3.2022, første revisjon innsendt 10.6.2022, godkjent 18.6.2022.

Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 13. september 2026.