
OX40-reseptor som angrepsmål ved atopisk dermatitt


FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

PETTER GJERSVIK

petter.gjersvik@tidsskriftet.no

Tidsskriftet

Rocatinlimab hemmer aktiverte T-cellers OX40-reseptor og har god effekt ved atopisk dermatitt hos voksne.



T-lymfocytter og kreftcelle, elektronmikroskopi. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library / NTB

De siste årene har det kommet flere nye legemidler med god effekt på atopisk dermatitt. Nå er rocatinlimab, et monoklonalt antistoff rettet mot OX40-reseptorene på aktiverte T-celler, prøvd ut i to store internasjonale fase 3-studier med voksne pasienter med moderat til atopisk dermatitt. Studiene er nylig publisert i én og samme artikkel i *The Lancet* [\(1\)](#).

I den ene studien ble 769 pasienter randomisert til subkutane injeksjoner med 300 mg eller 150 mg rocatinlimab eller placebo. I den andre studien ble 726 pasienter randomisert til 300 mg rocatinlimab eller placebo. Injeksjonene ble gitt ved uke 0, 2 og 4 og deretter hver 4. uke. Etter 24 uker var effekten av rocatinlimab signifikant bedre enn effekten av placebo, med en respons på minst 75 % reduksjon i EASI-skår hos

henholdsvis 42 %, 36 % og 13 % av pasientene i den ene studien ($p < 0,001$) og 33 % og 14 % i den andre studien ($p < 0,001$). Det samme gjaldt effekten målt med en sykdomsspesifikk investigatorskår. Samlet insidens av uønskete hendelser var omtrent lik i alle gruppene. Vanligste bivirkning i rocatinlimab-gruppene var feber (12 %), frysninger (2–6 %) og aftøse ulcerasjoner (3–4 %).

Annen virkningsmekanisme

- Disse studiene dreier seg om et legemiddel med en annen molekylær virkningsmekanisme enn andre monoklonale antistoffer og småmolekylære JAK-hemmere, sier Olav Sundnes, som er førsteamanuensis og overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus.
- Rocatinlimab kan derfor bli et aktuelt alternativ til pasienter som ikke responderer godt nok på slike midler, eller der det er kontraindikasjoner for slik behandling, mener han.
- Ved å hemme OX40-reseptoren, som regulerer proliferasjon og overlevelse av Th2-celler, har rocatinlimab en bredere effekt på den immunologiske prosessen ved atopisk dermatitt enn antistoffer som er rettet mot spesifikke cytokiner, blant annet interleukin (IL)-4 og IL-13, sier han.

Uklarheter

- To forhold er verdt å merke seg, påpeker Sundnes.
- Det ene er at effekten av rocatinlimab synes å være svakere og å inntre langsommere enn effekten av antistoffer rettet mot spesifikke interleukiner, og av JAK-hemmere. Det andre er at tre pasienter som fikk rocatinlimab-injeksjoner, måtte seponere behandlingen pga. gastrointestinal ulcerasjon. Vi trenger derfor både sammenliknende studier og flere langtidsdata.
- Uansett er dette spennende tider for oss som behandler pasienter med alvorlig atopisk dermatitt, sier Sundnes.

LITTERATUR

1. Guttman-Yassky E, Kabashima K, Worm M et al. Efficacy and safety of rocatinlimab for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis in ROCKET-IGNITE and ROCKET-HORIZON: two global, double-blind, placebo-controlled, randomised phase 3 clinical trials. Lancet 2026; 407: 53–66. [PubMed]

Publisert: 20. april 2026. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.26.0171
Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 13. juli 2026.