
LES MER ...

I DETTE NUMMER

Fra redaktøren

Vitenskapen er forurenset av feilsiteringer, misforståelser og akademiske vandrehistorier

Er 72 % av norske leger deprimerte?

Hvem skal få ny hjerteklaff?

Pasienter med injiserende rusmiddelbruk er utsatt for å få infeksøs endokarditt. Implantasjon av kunstig hjerteventil kan hos noen være livreddende. De som fortsetter rusmisbruket etter operasjonen, har økt risiko for ny infeksjon. Er det riktig å tilby ventilkirurgi for andre gang?

Prioritering i grenseland

Skal rusmiddelavhengige pasienter tilbys hjerteklaffkirurgi for andre gang?

Samme medisin, ulik informasjon

Legemidlers pakningsvedlegg formidler viktig informasjon til pasienter. Derfor er det viktig at informasjonen er forståelig, og at den er enhetlig mellom synonympreparater. I mange tilfeller er den langt fra det.

Pasientinformasjon i pakningsvedlegg

Legemidlers pakningsvedlegg – ulik informasjon om like preparater

Dødelig dop

Rusmidlet parametoksymetamfetamin er påvist i flere blodprøver i forbindelse med dødsfall i Norge. Stoffet har gatenavnet «death», men selges ofte som ecstasy eller amfetamin. Ruseffekten er langsomt innsettende, noe som lett kan gi overdosering. Det gjøres stadig økende beslag av dette svært toksiske stoffet.

Forgiftning med parametoksymetamfetamin

Nyttige fremkalte responser

Fremkalt respons-undersøkelser kan brukes for å påvise ledningsforstyrrelser i sentralnervesystemet. Metodene er blant annet nyttige for å vurdere prognose ved koma og kan også brukes intraoperativt for å forebygge varig skade på nervesystemet.

Fremkalt respons-undersøkelser i klinisk diagnostikk

Publisert: 7. mai 2013. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 11. juli 2026.